

Matematyka
Ciągi liczbowe

Aleksander Denisiuk

denisjuk@euh-e.edu.pl

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

ul. Lotnicza 2

82-300 Elbląg

Ciągi liczbowe

Najnowsza wersja tego dokumentu dostępna jest pod adresem

<http://denisjuk.euh-e.edu.pl/>

Definicja ciągów

Definicja 1. Jeżeli każdej liczbie naturalnej $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ jest podporządkowana liczba rzeczywista x_n , to zbiór numerowanych liczb rzeczywistych $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots$ nazywa się *ciągiem rzeczywistym*. Liczby rzeczywiste x_n nazywają się *elementami ciągu* $\{x_n\}$.

Przykłady

- Przykład 2.**
- $\left\{ \frac{1}{n^2} \right\} = 1, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{3^2}, \dots,$
 - $\{1 + (-1)^n\} = 0, 2, 0, 2, \dots$

Działania na ciągach

- Definicja 3.**
1. Ciąg $\{x_n \pm y_n\}$ nazywa się *sumą (różnicą)* ciągów $\{x_n\}$ i $\{y_n\}$,
 2. Ciąg $\{\lambda x_n\}$ nazywa się *iloczynem* liczby rzeczywistej λ i ciągu $\{x_n\}$.
 3. Ciąg $\{x_n y_n\}$ nazywa się *iloczynem* ciągów $\{x_n\}$ i $\{y_n\}$.
 4. Niech $y_n \neq 0$ dla $n = 1, 2, \dots$. Ciąg $\left\{\frac{x_n}{y_n}\right\}$ nazywa się *ilorazem* ciągów $\{x_n\}$ i $\{y_n\}$.

Uwaga 4. Jeżeli w definicji 3.4 $y_n = 0$ tylko dla skończonej ilości n , to można określić $\left\{\frac{x_n}{y_n}\right\}$ poczynając z numeru, dla którego $y_n \neq 0$.

Ciągi ograniczone i nieograniczone

Definicja 5. Ciąg $\{x_n\}$ nazywa się *ograniczonym z góry (z dołu)*, jeżeli $\exists M \in \mathbb{R}$ ($m \in \mathbb{R}$), takie że każdy element ciągu spełnia nierówność $x_n \leq M$ ($x_n \geq m$).

Ciąg, ograniczony z dołu i z góry nazywa się *ograniczonym*.

Oznaczenie: $x_n = O(1)$ (przy $n \rightarrow \infty$).

Lemat 6. Ciąg $\{x_n\}$ jest ograniczonym $\iff \exists A \in \mathbb{R}$, takie że $\forall n = 1, 2, 3, \dots |x_n| \leq A$.

Definicja 7. Ciąg $\{x_n\}$ nazywa się *nieograniczonym*, jeżeli $\forall A \in \mathbb{R}, A > 0 \exists x_n$, takie że $|x_n| > A$.

Przykład 8. 1. Ciąg $1, 2, 1, 4, 1, 6, \dots, 1, 2n, \dots$ jest nieograniczonym.

2. Ciąg $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ jest ograniczonym.

Ciągi nieskończenie duże

Definicja 9. Ciąg $\{x_n\}$ nazywa się *nieskończenie dużym*, jeżeli
 $\forall A \in \mathbb{R}, A > 0 \exists n \in \mathbb{N}$, takie że $\forall n > N \quad |x_n| > A$.

Oznaczenie: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$.

Innymi słowy: poczynając od pewnego n wszystkie x_n należą do otoczenia nieskończoności.

Definicja 10. • $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ jeżeli $\forall A \in \mathbb{R}, A > 0 \exists n \in \mathbb{N}$, takie że $\forall n > N \quad x_n > A$ (poczynając od pewnego n wszystkie x_n należą do otoczenia plus nieskończoności).

• $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$ jeżeli $\forall A \in \mathbb{R}, A > 0 \exists n \in \mathbb{N}$, takie że $\forall n > N \quad x_n < -A$ (poczynając od pewnego n wszystkie x_n należą do otoczenia minus nieskończoności).

Przykład 11. 1. $1, 2, 1, 4, 1, 6, \dots, 1, 2n, \dots$

2. $\{(-2)^n\}$

3. $\{n^2\}$

Ciągi nieskończenie małe

Definicja 12. Ciąg $\{x_n\}$ nazywa się *nieskończenie małym*, jeżeli

$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N}$, takie że $\forall n > N \quad |x_n| < \varepsilon$.

Oznaczenia: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, $x_n = o(1)$ (przy $n \rightarrow \infty$).

Innymi słowy: poczynając z pewnego n wszystkie x_n należą do otoczenia zera.

Przykład 13. Ciąg $q, q^2, \dots, q^n, \dots$ jest nieskończenie dużym przy $|q| > 1$ i nieskończenie małym przy $|q| < 1$.

Właściwości ciągów nieskończenie małych

- Twierdzenie 14.**
- *Suma nieskończenie małych ciągów jest ciągiem nieskończenie małym.*
 - *Różnica nieskończenie małych ciągów jest ciągiem nieskończenie małym.*
 - *Iloczyn ciągu ograniczonego i ciągu nieskończenie małego jest ciągiem nieskończenie małym.*
 - *Ciąg nieskończenie mały jest ograniczonym.*
 - *Iloczyn ciągów nieskończenie małych jest ciągiem nieskończenie małym.*
 - *Jeżeli ciąg jest stałym ($x_n = \text{const}$) i nieskończenie małym, to $x_n = 0$.*
 - *Jeżeli ciąg $\{x_n\}$ jest nieskończenie dużym, to ciąg $\left\{\frac{1}{x_n}\right\}$ (poprawnie określony poczynając z pewnego n) jest nieskończenie małym.*

Ciągi zbieżne

Definicja 15. Ciąg $\{x_n\}$ nazywa się *zbieżnym*, jeżeli istnieje liczba rzeczywista $a \in \mathbb{R}$, taka że ciąg $\{x_n - a\}$ jest nieskończenie małym. Liczba a nazywa się *granica ciągu*. Oznaczenie

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \quad \text{lub} \quad x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a.$$

Definicja 16. Ciąg $\{x_n\}$ nazywa się *zbieżnym*, jeżeli istnieje liczba rzeczywista $a \in \mathbb{R}$, taka że $\forall \varepsilon > 0$ istnieje numer $N \in \mathbb{N}$, taki że $\forall n > N$ zachodzi nierówność $|x_n - a| < \varepsilon$.

Definicja 17. Ciąg $\{x_n\}$ nazywa się *zbieżnym*, jeżeli istnieje liczba rzeczywista $a \in \mathbb{R}$, taka że w dowolnym otoczeniu (ε -otoczeniu) punktu a znajdują się wszystkie elementy ciągu $\{x_n\}$ poczynając od pewnego n .

Definicja 18. Ciąg, który nie jest zbieżnym, nazywa się *rozbieżnym*.

Przykład 19. $0, \underbrace{33333 \dots 3}_{n \text{ razy}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \frac{1}{3}$.

Właściwości ciągów zbieżnych

Twierdzenie 20. • Ciąg zbieżny ma dokładnie jedną granicę.

- Ciąg zbieżny jest ograniczonym.
- Suma (różnica, iloczyn) zbieżnych ciągów jest ciągiem zbieżnym do sumy (różnicy, iloczynu) granic.
- Jeżeli $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n \neq 0$, to ciąg $\left\{ \frac{1}{y_n} \right\}$ jest określony poczynając z pewnego n i jest ograniczony.
- Jeżeli $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n \neq 0$, i ciąg $\{x_n\}$ jest zbieżny, to iloraz $\left\{ \frac{x_n}{y_n} \right\}$ jest określony poczynając z pewnego n i jest zbieżnym do ilorazu granic.
- Jeżeli $\{x_n\}$ jest zbieżnym i poczynając z pewnego n zachodzi nierówność $x_n \geq b$ ($x_n \leq b$), to $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \geq b$ ($\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq b$).

Właściwości ciągów zbieżnych, cd.

- Jeżeli ciągi $\{x_n\}$ i $\{y_n\}$ są zbieżne i począwszy od pewnego n zachodzi nierówność $x_n \geq y_n$, to
$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \geq \lim_{n \rightarrow \infty} y_n.$$
- Jeżeli ciągi $\{x_n\}$ i $\{y_n\}$ są zbieżne, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ i począwszy od pewnego n zachodzi nierówność $x_n \geq z_n \geq y_n$, to ciąg $\{z_n\}$ jest zbieżnym do tej samej granicy.

Ciągi monotoniczne

- Definicja 21.**
- Ciąg $\{x_n\}$ nazywa się *rosnącym*, jeżeli $x_n < x_{n+1}$ dla $n = 1, 2, 3, \dots$
 - Ciąg $\{x_n\}$ nazywa się *malejącym*, jeżeli $x_n > x_{n+1}$ dla $n = 1, 2, 3, \dots$
 - Ciąg $\{x_n\}$ nazywa się *niemalejącym*, jeżeli $x_n \leq x_{n+1}$ dla $n = 1, 2, 3, \dots$
 - Ciąg $\{x_n\}$ nazywa się *nierosnącym*, jeżeli $x_n \geq x_{n+1}$ dla $n = 1, 2, 3, \dots$
 - Ciąg nazywa się *monotonicznym*, jeżeli jest on nierosnącym lub niemalejącym.

Twierdzenie o ograniczonym ciągu monotonicznym

Twierdzenie 22. *Monotoniczny ograniczony ciąg jest zbieżnym.*

Twierdzenie o przedziałach zstępujących

Definicja 23. Ciąg przedziałów $[a_1, b_1], [a_2, b_2], \dots$ nazywa się *ciągami przedziałów zstępujących*, jeżeli

1. $a_n \leq a_{n+1}, b_{n+1} \leq b_n$ dla $n = 1, 2, 3, \dots$,
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$.

Twierdzenie 24. Ciąg przedziałów zstępujących ma dokładnie jeden punkt należący do każdego przedziału ciągu.

Liczba e

Twierdzenie 25.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e = 2,718\,281\,828\,459\,045\,235\,360\,287\,471\,352\,662 \dots$$

Dowód. Ciąg jest rosnący i ograniczony z góry.

□

Przybliżone obliczenie pierwiastka

Twierdzenie 26. Niech $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$, $n = 1, 2, 3 \dots$, gdzie $a > 0$, $x_1 > 0$.

Wtedy $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{a}$.

Dowód. 1. $x_n > 0$.

2. $x_{n+1} = \frac{\sqrt{a}}{2} \left(\frac{x_n}{\sqrt{a}} + \frac{\sqrt{a}}{x_n} \right) \geq \sqrt{a}$ bowiem $t + 1/t \geq 2$.

3. $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{a}{x_n^2} \right) \leq 1$.

Więc ciąg jest malejącym (dla $n > 2$) i ograniczonym z dołu i jego granica spełnia równanie $x = \frac{1}{2} \left(x + \frac{a}{x} \right)$. □

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{t^n}{n!}$$

Twierdzenie 27.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{t^n}{n!} = 0.$$

Dowód. 1. Poczynając od pewnego n zachodzi nierówność $|t| < n + 1$.

2. $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{t}{n+1} < 1$ poczynając od pewnego n .

Więc ciąg jest malejącym poczynając od pewnego n i ograniczonym z dołu i

go granica spełnia równość $x = x \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|t|}{n+1} = 0$. □

Dowolne ciągi. Kryterium Cauchy'ego zbieżności ciągu

Twierdzenie 28. Ciąg $\{x_n\}$ jest zbieżnym $\iff \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$, takie że $\forall n, m > N \quad |x_n - x_m| < \varepsilon$.