

*Matematyka*  
*Funkcje Elementarne*

Aleksander Denisiuk

denisjuk@euh-e.edu.pl

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

ul. Lotnicza 2

82-300 Elbląg

# Funkcje Elementarne

Najnowsza wersja tego dokumentu dostępna jest pod adresem

<http://denisjuk.euh-e.edu.pl/>

# Potęga wymierna

**Twierdzenie 1.** Niech  $n \in \mathbb{N}$ . Wtedy funkcja  $x^n$  przy  $x \in [0, +\infty)$  rośnie i jest ciągłą.

*Dowód.*  $x_2^n - x_1^n = (x_2 - x_1)(x_2^{n-1} + x_2^{n-2}x_1 + \cdots + x_1^{n-1})$ . □

**Wniosek 2.** Istnieje funkcja, odwrotna do  $x^n : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ , pierwiastek stopnia  $n$ :  $y \mapsto \sqrt[n]{y}$ .

**Definicja 3.** Niech  $\alpha$  będzie liczbą wymierną. Wtedy dla  $a > 0$  określone jest  $a^\alpha$  w sposób następujący:

1. Dla  $n > 0$ :  $x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ ,
2. dla  $m, n > 0$ :  $a^{\frac{m}{n}} = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^m$ ,
3.  $a^0 = 1$ ,
4. dla  $\alpha < 0$ :  $a^\alpha = \frac{1}{a^{-\alpha}}$ .

## Własności wymiernej potęgi

**Twierdzenie 4.** 1.  $(a^\alpha)^\beta = a^{\alpha\beta}$ ,  $a^\alpha \cdot b^\alpha = (ab)^\alpha$ ,  $a^\alpha \cdot a^\beta = a^{\alpha+\beta}$ .

2. Dla  $a > 1$  oraz  $\alpha > 0$   $a^\alpha > 1$ .

3. Dla  $a > 1$  funkcja  $a^x$  rośnie na zbiorze liczb wymiernych.

*Dowód.* 2. Załóżymy, że  $a^{\frac{m}{n}} < 1$ .

3.  $a^{\frac{m_1}{n_1}} < a^{\frac{m_2}{n_2}}$  dla  $\frac{m_1}{n_1} < \frac{m_2}{n_2}$ .

□

# Funkcja wykładnicza

**Twierdzenie 5.** Niech dane będą  $x, a \in \mathbb{R}$ ,  $a > 1$ . Istnieje jedyna liczba rzeczywista  $y$ , taka, że dla dowolnych liczb  $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$ ,  
 $\alpha < x < \beta \Rightarrow a^\alpha \leq y \leq a^\beta$ .

**Definicja 6.** Definiujemy dla  $a > 1$ ,  $x \in \mathbb{R}$ , potęgę  $a^x$  jako jedyną liczbę, określoną w twierdzeniu 5. Dla  $0 < a < 1$  definiujemy  $a^x = \left(\frac{1}{a}\right)^{-x}$ .

## Własności funkcji wykładniczej

**Twierdzenie 7.** 1.  $(a^\alpha)^\beta = a^{\alpha\beta}$ ,  $a^\alpha \cdot b^\alpha = (ab)^\alpha$ ,  $a^\alpha \cdot a^\beta = a^{\alpha+\beta}$ .

2. Funkcja  $a^x$  dla  $a > 1$  rośnie, dla  $0 < a < 1$  maleje na całą prostą.


3. Funkcja  $a^x$  jest ciągłą  $\forall x \in \mathbb{R}$ .

4. Funkcja  $a^x$  jest dodatnią  $\forall x \in \mathbb{R}$ .

5. Dla  $a > 1$   $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$ , dla  $0 < a < 1$   
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$ .

6. Zbiorem wartości funkcji  $a^x$  ( $a \neq 1$ ) jest półprosta  $(0, +\infty)$ .

## Wykres funkcji $y = a^x$



**Rysunek 1:** Wykres funkcji  $y = a^x$  dla  $a > 1$  (po lewej) oraz dla  $0 < a < 1$  (po prawej)

# Logarytm

**Definicja 8.** Funkcję  $\log_a x : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$  definiujemy jako odwrotną do  $a^x : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ .

## Własności logarytmu

**Twierdzenie 9.** 1.  $\log_a(x_1 \cdot x_2) = \log_a x_1 + \log_a x_2$ ,



$$\log_a\left(\frac{x_1}{x_2}\right) = \log_a x_1 - \log_a x_2, \quad \log_a(x^\alpha) = \alpha \cdot \log_a x,$$

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}.$$

2. *Funkcja  $y = \log_a x$  jest ciągłą i rosnącą na półprostej  $(0, +\infty)$  dla  $a > 1$  oraz malejącą dla  $0 < a < 1$ .*

3.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = -\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty$  przy  $a > 1$  oraz  
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = -\infty$  przy  $0 < a < 1$ .

## Wykres funkcji $y = \log_a x$



**Rysunek 2:** Wykres funkcji  $y = \log_a x$  dla  $a > 1$  (po lewej) oraz dla  $0 < a < 1$  (po prawej)

*Uwaga 10.* Logarytm przy podstawie  $e$  nazywa się *naturalnym* i oznacza się  $\ln x$ .

# Funkcja potęgowa

**Definicja 11.** Dla  $\alpha \in \mathbb{R}$ , określamy funkcję  $x^\alpha : (0, +\infty) \rightarrow (0, \infty)$  w sposób następujący:  $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$ .

## Własności funkcji potęgowej



**Twierdzenie 12.** 1. Funkcja  $x^\alpha$  jest funkcją ciągłą na  $(0, +\infty)$ .

2. Funkcja  $x^\alpha$  jest funkcją rosnącą przy  $\alpha > 0$  i malejącą przy  $\alpha < 0$  na przedziale  $(0, +\infty)$ .

3.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = 0$  przy  $\alpha > 0$  oraz  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = +\infty$  przy  $\alpha < 0$ .

4.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = +\infty$  przy  $\alpha > 0$  oraz  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = 0$  przy  $\alpha < 0$ .

## Wykres funkcji $y = x^\alpha$



Rysunek 3: Wykres funkcji  $y = x^\alpha$  dla  $\alpha > 0$  (po lewej) oraz dla  $\alpha < 0$  (po prawej)

# Podstawowe własności funkcji trygonometrycznych

---

**Twierdzenie 13.** 1.  $\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y,$

2.  $\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y,$

3.  $\sin^2 x + \cos^2 y = 1,$

4.  $\sin 0 = 0, \sin \frac{\pi}{2} = 1,$

5.  $\cos 0 = 1, \cos \frac{\pi}{2} = 0,$

6. Dla  $0 < x < \frac{\pi}{2}$   $0 < \sin x < x < \frac{\sin x}{\cos x}.$

# Własności funkcji trygonometrycznych

---

- Wniosek 14.**
1.  $|\sin x| \leq 1, |\cos x| \leq 1,$
  2.  $\sin(-x) = -\sin x, \cos(-x) = \cos x,$
  3.  $\sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y,$
  4.  $\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y,$
  5.  $\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2},$
  6.  $\sin x - \sin y = 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2},$
  7.  $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right),$
  8.  $\sin(x + 2\pi) = \sin x, \cos(x + 2\pi) = \cos x,$
  9.  $|\sin x| \leq |x|.$

# Funkcje okresowe

---

**Definicja 15.** Funkcja  $f(x)$  nazywa się *okresową*, jeżeli istnieje minimalna liczba  $T \in \mathbb{R}$ , taka, że  $\forall x$  zachodzi  $f(x + T) = f(x)$ . Liczba  $T$  przy tym nazywa się *okresem funkcji*  $f(x)$ .

*Uwaga 16.* Własność 8 oznacza, że funkcje  $\sin x$  i  $\cos x$  mają okres  $2\pi$ . Można udowodnić, że  $2\pi$  jest najmniejszym z okresów.

*Uwaga 17.* Stała funkcja nie jest okresową.

## Własności funkcji $\sin x$ oraz $\cos x$ . Cd.

**Twierdzenie 18.** *Funkcje  $\sin x$  oraz  $\cos x$  są ciągłe na całej prostej  $\mathbb{R}$ .*


*Dowód.* •  $\sin x$  jest ciągłą w zerze.

- $\sin x - \sin x_n = 2 \cos \frac{x+x_n}{2} \sin \frac{x_n-x}{2}$  jest ciągiem nieskończone małym dla ciągu  $x_n \rightarrow x$ .
- $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ .

□

**Twierdzenie 19.** *Funkcja  $\sin x$  rośnie na każdym z przedziałów  $[2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}]$  i maleje na każdym z przedziałów  $[(2k+1)\pi - \frac{\pi}{2}, (2k+1)\pi + \frac{\pi}{2}]$ , zaś funkcja  $\cos x$  rośnie na każdym z przedziałów  $[2k\pi, 2k\pi + \pi]$  i maleje na każdym z przedziałów  $[2k\pi - \pi, 2k\pi]$ . Wszędzie  $k$  jest liczbą całkowitą,  $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$*

## Wykresy funkcji $\sin x$ oraz $\cos x$



Rysunek 4: Wykres funkcji  $y = \sin x$  (po lewej) oraz  $y = \cos x$  (po prawej)

## Funkcje $\operatorname{tg} x$ , $\operatorname{ctg} x$

**Definicja 20.** 1.  $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$

2.  $\operatorname{ctg} x = \frac{\cos x}{\sin x}$ .

*Uwaga 21.* W literaturze anglojęzycznej używa się oznaczeń  $\tan x$  oraz  $\cot x$ .


## Własności funkcji $\operatorname{tg} x$ i $\operatorname{ctg} x$

**Twierdzenie 22.** 1. *Funkcja  $\operatorname{tg} x$  jest ciągłą przy  $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ , zaś funkcja  $\operatorname{ctg} x$  jest ciągłą przy  $x \neq k\pi$ .*

2. *Funkcje  $\operatorname{tg} x$  oraz  $\operatorname{ctg} x$  mają okres  $\pi$ .*

3. *Funkcja  $\operatorname{tg} x$  rośnie na każdym z przedziałów  $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$ , zaś funkcja  $\operatorname{ctg} x$  maleje na każdym z przedziałów  $(k\pi, \pi + k\pi)$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ).*

## Wykresy funkcji $\operatorname{tg} x$ oraz $\operatorname{ctg} x$





Rysunek 5: Wykres funkcji  $y = \operatorname{tg} x$  (po lewej) oraz  $y = \operatorname{ctg} x$  (po prawej)

## Funkcje kołowe (odwrotne trygonometryczne funkcje)

- Definicja 23.**
- $\arcsin x : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  jest funkcją odwrotną do  $\sin x : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$ .
  - $\arccos x : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$  jest funkcją odwrotną do  $\cos x : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$ .
  - $\operatorname{arctg} x : (-\infty, +\infty) \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  jest funkcją odwrotną do  $\operatorname{tg} x : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow (-\infty, +\infty)$ .
  - $\operatorname{arcctg} x : (-\infty, +\infty) \rightarrow (0, \pi)$  jest funkcją odwrotną do  $\operatorname{ctg} x : (0, \pi) \rightarrow (-\infty, +\infty)$ .



- Twierdzenie 24.**
1. *Wszystkie te funkcje są ciągłe,*
  2. *funkcje  $\arcsin x$  i  $\operatorname{arctg} x$  są rosnące,*
  3.  *$\arccos x$  oraz  $\operatorname{arcctg} x$  są malejące.*

## Wykresy funkcji $\arcsin x$ oraz $\arccos x$



Rysunek 6: Wykres funkcji  $y = \arcsin x$  (po lewej) oraz  $y = \arccos x$  (po prawej)

## Wykresy funkcji $\operatorname{arctg} x$ oraz $\operatorname{arcctg} x$



Rysunek 7: Wykres funkcji  $y = \operatorname{arctg} x$  (po lewej) oraz  $y = \operatorname{arcctg} x$  (po prawej)

# Funkcje hiperboliczne

**Definicja 25.** 1. Funkcja  $\sinh = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$  nazywa się *sinusem hiperbolicznym*

2. Funkcja  $\cosh = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$  nazywa się *cosinusem hiperbolicznym*

3. Funkcja  $\operatorname{tgh} = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$  nazywa się *tangensem hiperbolicznym*

4. Funkcja  $\operatorname{ctgh} = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$  nazywa się *cotangensem hiperbolicznym*



**Twierdzenie 26.** *Funkcje hiperboliczne są ciągłe we wszystkich punktach prostej  $\mathbb{R}$  (cotangens hiperboliczny oprócz punktu  $x = 0$ ).*

**Twierdzenie 27.**

$$\sinh(x + y) = \sinh x \cdot \cosh y + \cosh x \cdot \sinh y,$$



$$\cosh(x + y) = \cosh x \cdot \cosh y + \sinh x \cdot \sinh y.$$

## Wykresy funkcji $\sinh x$ oraz $\cosh x$



Rysunek 8: Wykres funkcji  $y = \sinh x$  (po lewej) oraz  $y = \cosh x$  (po prawej)

## Wykresy funkcji $\operatorname{tgh} x$ oraz $\operatorname{ctgh} x$



Rysunek 9: Wykres funkcji  $y = \operatorname{tgh} x$  (po lewej) oraz  $y = \operatorname{ctgh} x$  (po prawej)

## Dwie granice

**Twierdzenie 28.**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$

**Twierdzenie 29.**  $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x} = e.$